



Το VitiSan® είναι ένα μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση. Δρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των μυκηλιακών υφών, χάρη στην αλληλεπίδραση πολλών φυσικών παραγόντων όπως το pH και την ωσμωτική πίεση. Αναστέλλει επίσης την βιωσιμότητα των спорίων του μύκητα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τα 2/3 με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Σημειώστε πως το σκεύασμα είναι υγροσκοπικό και μπορεί να κρυσταλλώσει κατά την αποθήκευση δημιουργώντας συσσωματώματα. Θρυμματίστε τα συσσωματώματα πριν τα προσθέσετε στο ψεκαστικό δοχείο.

Η κρυστάλλωση δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό. Ξεπλύνετε καλά, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με όξινα σκευάσματα. Γενικά συστήνεται να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που αλλάζουν το pH του ψεκαστικού διαλύματος, διότι μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Μπορεί να συμβάλει σε στρατηγικές αντιμετώπισης της ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα, ειδικά για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου και του ωίδιου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα στην φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανάνα και Κορινθιακή Σταφίδα.

Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι, Αγγούρι (Υ), Κολοκύθι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ):-

VitiSan®

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Μορφή: Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

- Δραστική ουσία: 99,5% β/β potassium hydrogen carbonate
- Βοηθητικές ουσίες: 0,01% β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το προϊόν είναι κατάλληλο για βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.

BIOFA
A member of the Andermatt Group

anthesis
Blooming together

Κάτοχος της άδειας:
Biofa AG, Rudolf-Diesel Str. 2,
72525 Münsingen, Γερμανία

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά:
60834 / 07.02.2019

Αριθμ. Παρτίδας: Βλ. επί συσκευασίας
Ημ/α Παραγωγής: Βλ. επί συσκευασίας

Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην αγορά: ANTHESIS ΕΠΕ

Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά
Τ 210 8012367, Φ 210 6233196

E info@anthesis.gr
www.anthesis.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 5Kg

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	γρ. / στρέμ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μεγ. αρ. εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
Μηλιά	Φουζικλάδιο Ωίδιο	500	100	Από την αρχή της βλάστησης των φυτών έως πριν τη συγκομιδή	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6-10 ημερών*
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο	500	100	Από την αρχή της βλάστησης των φυτών έως πριν τη συγκομιδή	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6-10 ημερών*
Αμπέλι (επιτραπέζια και αινोποιήσιμα σταφύλια)	Ωίδιο	600	60	Από την αρχή της βλάστησης των φυτών έως τη συγκομιδή	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών
Κολοκυνθοειδή Υπαίθρου Αγγούρι Υπαίθρου, Κολοκύθι Υπαίθρου Κολοκύθα Υπαίθρου Πεπόνι Υπαίθρου Καρπούζι Υπαίθρου	Ωίδιο	500	60-100**	Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών έως την πλήρη ωρίμανση	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3-10 ημερών

Παρατηρήσεις:
* Σε υψηλές θερμοκρασίες και με ξηρές συνθήκες χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα εφαρμογών.
** Ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών ή στα πρώτα στάδια εμφάνισης των ασθενειών.
Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών προειδοποιήσεων.

Δηλώσεις επικινδυνότητας: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Πρώτες βοήθειες / Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν. Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, να πει άφθονο νερό. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777