

Cupros® 50 WP

Cupros® 50 WP

Cupros® 50 WP

Cupros® 50 WP

- Copper hydroxide (μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)
- Βρέσιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση:

Μεταλλικός χαλκός 50% β/β
(σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού,
χημ. ομάδα: ανόργανα άλατα χαλκού)

Βοηθητικές ουσίες 15,97% β/β



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πρόϊόν.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

021901α

Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60791/21-12-2018

Περιεχόμενο: 1 κιλό

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αντίδοτο: Πενικιλλαμίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Γερμανία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 -6860130, www.bASF-agro.gr

© Σήμα κατατεθέν. Spiess-Urania Chemicals

BASF
We create chemistry

- Copper hydroxide (μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ (σε γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα) – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινά, Πορτοκαλιά: Για Κορυφοξήρα, Ανθράκωση και Σεπτορίωση, εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινόπωρου. Για Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών (*Pseudomonas syringae*), εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάρη ή παγετό. Για Φυτόφθωρα καρπών, εφαρμογές το δεύτερο μέρος του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3-4 μήνες. Συνιστάται να χαρτά λικένια καλδάνια μετά από το έδαφος. **Δόση:** 100-225 γραμ. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 200-250 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

Αμυγδαλιά: Για Εξώασκο, στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και τον χειμώνα πριν την έκπτυξη των ξυλαφόρων οφθαλμών. Για Κηλιδωτά φύλλων, εφαρμογές που αρχίζουν μετά την πτώση των πετάλων και επαναλαμβάνονται κάθε 15-20 ημέρες. **Δόση:** 130-230 γραμ. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

Καρποί: Για Ανθράκωση και Βάκτηση φύλλων και καρπών, εφαρμογές πριν την έκπτυξη των φύλλων και επανάληψη μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 110-190 γραμ. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 100-120 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.

Μηλιά, Αχλαδιά: Για Φουντικάδιο, Σεπτορίωση, εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης κορυφής. Για Βακτηριώση και Βακτηριακό κάψιμο, στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, συνιστώνται 2 εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. **Δόση:** 110-255 γραμ. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

Βερικοκιά: Για Κορύνεο, στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και στη διάρκεια του χειμώνα. **Δόση:** 130-200 γραμ. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 100-120 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

Κεραστή: Για Κορύνεο και προσβολή από *Pseudomonas syringae*, στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των φύλλων. **Δόση:** 130-200 γραμ. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 100-120 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.

Ροδακινιά, Δαμασκηνιά: Για Κορύνεο, Εξώασκο και Κλαδοσπόρωση, στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. Για Φαιάση σπήλη, εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη δρόσινη κορυφή. **Δόση:** 110-200 γραμ. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 100-120 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

Κερασί: Για Κορύνεο και προσβολή από *Pseudomonas syringae*, στις περιοχές που αρχίζουν πριν τη διάρκεια της πτώσης των φύλλων και στη διάρκεια του χειμώνα. **Δόση:** 110-120 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.

Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποίησμα σταφύλιο): Για Περονόσπορο, Ανθράκωση και Βακτηριακή νέκρωση, εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **Δόση:** 42,5-200 γραμ. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.

Αμπέλι (για επιπράτεζα και οινοποίησμα σταφύλιο): Για Περονόσπορο, Ανθράκωση και Βακτηριακή νέκρωση, εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι κραπούτες γίνονται έχοντας μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν τη γονιμοποίηση. **Δόση:** 42,5-200 γραμ. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.

Ελιά: Για Κυκλοκάνια, στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι την άνοιξη. **Δόση:** 165-360 γραμ. το φθινόπωρο και 165-315 γραμ. την άνοιξη. Για Γλωσσόπορο, 2 εφαρμογές, πρώτη στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **Δόση:** 160 γραμ. το φθινόπωρο και 165-315 γραμ. την άνοιξη. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 10-12 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.

Τομάτα, Πιπέρια (Υπαίθριο), Θερμοκηπίου: Για Περονόσπορο, Ανθράκωση και Βακτηριακή νέκρωση, εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι κραπούτες γίνονται έχοντας μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν τη γονιμοποίηση. **Δόση:** 165-315 γραμ. το φθινόπωρο και 165-315 γραμ. την άνοιξη. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.

Τομάτα, Πιπέρια (Υπαίθριο), Θερμοκηπίου: Για Περονόσπορο, Κλαδοσπόρωση, εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθένειών και επανάληψη από 10-14 ημέρες ανάλογη με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 10-200 γραμ. για βαριά προσβολή και 55-160 γραμ. για ελαφριά προσβολή. **Όγκος ωκεαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.

Φασόλι: Για Κερκοσπόρωση, εφαρμογές με την εμφάνιση