



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. "Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό"

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο: **Αν πέσει στα ρούχα ή το δέρμα:** βγάλτε τα ρούχα και πλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό και σαπούνι το δέρμα που ήλθε σε επαφή με το σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό. Τα ρούχα να μην ξαναφορεθούν πριν πλυθούν καλά. **Αν πέσει στα μάτια:** ρίξτε αμέσως άφθονο νερό. **Αν καταποθεί:** ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210. 77.93.777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ασφάλκη ζώνη προστασίας: **-5 μ** μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες

Βαμβάκι, τομάτες, μελιτζάνες, πεπονίου και καρπούζι αγρού.

-10 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργεια **αμπελιού**

-20 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες **εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρηνόκαρπων**

Για να προστατέψετε τα μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήσετε μια ασφάλκη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή της ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνεται μια εφαρμογή κατά έτος. **Φυτοτοξικότητα:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις προτεινόμενες καλλιέργειες και οδηγίες χρήσης. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος.

Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: -Εσπεριδοειδή, Βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά: 14 μέρες, Δαμασκηλιά, Κερασιά: 3 ημέρες - Μηλοειδή, σταφύλια: 28 μέρες, -Τομάτα και μελιτζάνα (θερμοκηπίου και υπαίθρου),καρπούζι και πεπόνι (υπαίθρου): 3 μέρες, φράουλες: 3 μέρες, -Βαμβάκι: 35 μέρες. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός πλήρους κάλυψης του φυλλώματος με καλή κάλυψη της επιφάνειας των φύλλων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ -ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική αραβίαση συσκευασίας σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω από 0 °C

Ημ. Παρασκευής, Αρ. Παρτίδας: Βάλετε επί της συσκευασίας

BORNEO

11SC

Συμπυκνωμένο
εναιώρημα (SC)

Εγγ. Σύνθεση: etoxazole (ετοξαζόλ) 11% β/ο,
Βοηθ. Ουσίες: 88,84% β/β

Αρ. Έγκρ. κυκλοφορίας:2108 / 18-10-2005

**Ακαρεοκτόνο επαφής.
Παρεμποδίζει την εξέλιξη των αυγών
και των άλλων ατελών μορφών
των ακάρεων καθώς και τη
γονιμότητα των θηλυκών ατόμων**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Παρασκευαστής -
Κατοχος της έγκρισης-
Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.,
T.K. 69370 Saint Didier au Mont D'Or, Γαλλία
Εργοστάσιο παρασκευής: SBM Formulation, Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας:
Διανομέας - Υπεύθυνος επικαινοίας:



Περιεχόμενο:
500 κ.εκ.

ΑΘΗΝΑ:

Φλέμιγκ 15, Μορούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
www.hellafarm.gr - e-mail: info@hellafarm.gr

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος** εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλιέργητική περίοδο
		ml/ στρέμμα	ml/100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ.υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά.)	Τετράνυχτοι κίτρινοι (<i>Tetranychus urticae</i>) Κόκκινοι (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 max	25-30	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά	1 εφαρμογή
			35-50	100		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά δαμασκηλιά	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i>)	50 max	25-30	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά	1 εφαρμογή
			35-50	100		
			40-50	100-120		
κερασιά	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i> TETRUR, <i>Panonychus ulmi</i> METTUL)	50 max	35-50	100-140	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά	1 εφαρμογή
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λεμονιά, μανταρίνια, πορτοκιά, γκρέιτ φρουτ φράπες)	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i>)		15	200-300	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
			20	200-250		
			25	200		
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i>)	25 max	25	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης.Τέλος Ανοιξης - μέσα Ιουνίου με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
			30-50	50		
Τομάτα Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 max	25-35	50-100 (υπαίθρου)	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
			25-30	50-150 (θερμοκηπίου)		
			35	50-100 (θερμοκηπίου)		
Καρπούζι, πεπόνι (υπαίθρου)	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	30 - 35	35-50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
Φράουλα (υπαίθρου και υπό κάλυψη)	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 - 50	50	80-100		
Βαμβάκι	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	30- 37,5	-	50-80	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Πριν από το άνοιγμα των καρπών, με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
Τριανταφυλλιά (θερμοκήπιο)	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	50max	25-50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή

*Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού. ** Σύμφωνα με τις Γεωργικές Προετοιμασίες των τοπικών γραφείων φυτοπροστασίας. Αν η εφαρμογή καθυστερήσει και είναι παρών μεγάλος αριθμός ενηλίκων πρέπει να εφαρμοστεί ακαρεοκτόνο με δράση σε ενήλικα. Διάρκεια προστασίας 45-60 ημέρες.