



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
Επιβαρύνει σε περίπτωση κατάποσης.
Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΩΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Αποφεύγετε να αναπνεύσετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
Για την εφαρμογή με τρακτέρ, φοράτε ολόσωμη φόρμα, κατάλληλη γάντια και μπότες.



Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλῆτης, φοράτε προστατευτική μάσκα, ολόσωμη φόρμα, κατάλληλη γάντια και μπότες/φόρμα και ψεκασμό.

Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φορέσει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).



Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αμειβάτε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά το προσβεβλημένο μέρος του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, προκαλέστε εμετό και μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως σε πλησιέστερο νοσοκομείο. Μη χορηγήσετε τίποτα και μη προκαλέσετε εμετό στον παθόντα, εάν δεν έχει τις οδηγίες τους.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



Brice® 20SL

Diquat (Ντικουάτ) 20%
Πυκνό διάλυμα

Μη εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πλάτυφυλλων. Χρησιμοποιείται και σαν αποφυλλωτικό για τη διευκόλυνση της συγκομιδής.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Diquat20% β/ο
(υπο μορφή diquat dibromide ...37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες66,4% β/β

A.A.D.A.: 7982/23.04.2012

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Κάτοχος της Άδειας: Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Syngenta Hellas AEE

Λ. Ανθούσης, 15349 Ανθούσια Αττικής

Τηλ.: 2106666612-13, Φαξ: 2106665777

Διανομείς:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάνια

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΜΠΡΑΪΣ:

Μη εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πλάτυφυλλων. Χρησιμοποιείται και σαν αποφυλλωτικό σε συγκεντρωμένες καλλιέργειες με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καθολικός ομομόρφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μην τύπω ακούσιος. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΞΠΕΡΙΔΟΞΙΔΗ (Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά-Γκρέιφ Φρουτ-Λιμεττάρ-Φράπια)-ΠΥΡΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακιά-Βερυκοκιά-Κερασιά-Βυσσινιά-Δαμασκινιά)-ΜΗΛΟΞΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά)-ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά-Φουντουκιά-Φιστικιά-Καστανιά-Καρυδιά)-ΕΛΙΕΣ (ελαιοποιήσιμες)-ΑΜΠΕΛΙ: Πλάτυφυλλα ζιζάνια. Δόση: 330-500 κ.εκ./στρ. Διαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100-200 κιλό καθαρό νερό, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων. **ΤΡΙΦΥΛΛΗ-ΜΗΔΙΚΗ: Cuscuta sp.** Δόση: 200-250 κ.εκ./στρ. Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη, ράντισμα μετά την κοπή. **ΠΑΤΑΤΑ:** Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή. Δόση: 400 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός κατά την περίοδο της συγκομιδής, βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία. **ΜΗΔΙΚΗ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ:** Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή. Δόση: 300-350 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός 2-6 ημέρες πριν τη συγκομιδή του σπόρου.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων. **2)** Η χρήση στις δενδροειδείς καλλιέργειες και στο αμπελή πρέπει να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων και του αμπελιού. **3)** Η χρήση για αποξήρανση πριν την συγκομιδή στην μηδική επιτρέπεται μόνο σε καλλιέργειες που προορίζονται για απορροπαγωγή. Η εναπομένουσα φυτική μάζα (σανός) καθότι και το υπέργειο τμήμα της πατάτας να μην χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή. **4)** Σε ελαιώδη που έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος απορροπαίνεται να συγκομίζονται καρποί απευθείας από το έδαφος παρά μόνο όταν γίνεται χρήση δικτύων/ελαστικών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΞΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Η είσοδος του εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή. 10 ημέρες για είσοδο ζώων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Εσπερίδοξη (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιφ Φρουτ, Λιμεττάρ, Φράπια), Πυρνοκάρπα (Ροδακιά, Βερυκοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Δαμασκινιά), Μηλοξιά (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά), Ελίες (ελαιοποιήσιμες), Αμπελή: **30 ημέρες**. Πατάτα: **10 ημέρες**. Τριφύλλι, Μηδική, Μήδικη για απορροπαγωγή: **Δεν ορίζεται**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Διατηρείται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία στο να χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

01/2016-12