**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**
**Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.**
**Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one and reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για διαχείρισή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν αψίκαστη ζώνη 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για σπαρώνες και βαχανικά και 10 μέτρων για αμπέλια και μεγάλες καλλιέργειες.
Για να προστατεύσετε τα αρθρόποδα, να αφήσετε μίαν αψίκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.
**Να μην εφαρμόζεται κατά την εποχή που οι μέλισσες συλλέγουν.**
Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίαση, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.
Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

***Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.***

**Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:**
***Σε περίπτωση εισπνοής***, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
***Σε περίπτωση κατάποσης***, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήσετε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
***Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια***, ξεπλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Εάν εμφανισθεί ερεθισμός, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
***Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα***, ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος, στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό, με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετέ τα πριν τα ξαναφορέσετε.
***Αντίδοτο:*** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777**

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**
Καπνός: **30 ημέρες**. Βαμβάκι-Κρεμμιδάκι-Σκόρδο: **21ημέρες**. Αμπέλι: **14 ημέρες**.
Ελιά - δολωματικός ψεκασμός: **14 ημέρες**, Ψεκασμός κάλυψης: **56 ημέρες**.
Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσμουλιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Ζαχαρότευτλα-Τομάτα (Υ): **7 ημέρες**.
Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Μαρούλι (Θ)-Πατάτα-Μπδική-Τομάτα (Θ): **3 ημέρες**.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακρυά από την πρόσφατα ψεκασμένη περιοχή.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:**
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

02/2016-7

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:**
Αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αερίζόμενο ,στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε θερμοκρασίες <40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.του.

# Bulldock® 2,5SC

## Beta-cyfluthrin (Μπέτα-συφλουθρίν) 2,5%
## Συμπυκνωμένο εναιώρημα

**Μη διασυστηματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων.**

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**
Beta-cyfluthrin .....2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες .....97,55% β/β

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

Α.Α.Δ.Α.: 14328/03.06.2009

| | |
|---|---|
| Αριθμός Παρτίδας: | ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία παραγωγής: | |

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ**

Κάτοχος της Άδειας:-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
**Θεσσαλονίκη**: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
**Εργοστάσιο**: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του ΕΣΥΦ

**ΜΠΟΥΑΝΤΟΚ:** Μη διασυστηματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Το beta-cyfluthrin ανήκει στην ομάδα των πυρεθρινοειδών και δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμμένα στους διαύλους ιόντων νατρίου στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Ελιά: Δολωματικοί ψεκασμοί.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος ανοδείωντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**
***ΜΗΛΙΑ***: Καρπόκαψα, Φυλλορύκτες (Νάρκες), Θρίπες, Ανθονόμος, Ξυλοφάγα έντομα, Κηκιδόμυγα. Δόση: **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ***ΑΧΛΑΔΙΑ***: Καρπόκαψα, Φυλλορύκτες (Νάρκες), Ψύλλα, Θρίπας, Ανθονόμος, Ξυλοφάγα έντομα, Κηκιδόμυγα. Δόση: **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ***ΚΥΔΩΝΙΑ***: Θρίπας, Ανθονόμος, Ξυλοφάγα έντομα, Κηκιδόμυγα. Δόση: **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. ***ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ***: Μύγα της Μεσογείου, Θρίπας, Ανθονόμος, Ξυλοφάγα έντομα, Κηκιδόμυγα. Δόση: **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ***ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ***: Ανάρσια, Καρπόκαψα, Θρίπας, Ξυλοφάγα έντομα, Δροσόφιλβα. Δόση: **50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Μέγιστη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ***ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ***: Ανάρσια, Καρπόκαψα, Θρίπας, Ξυλοφάγα έντομα, Κατνώδης. Δόση: **50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Μέγιστη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ***ΑΜΠΕΛΙ***: Δόση: **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Ευδεμίδα, Τζιτζικάκια. Ψεκασμοί καλύψεως, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, κατά την εκκόλαψη των προνυμφών της 2ης και 3ης γενεάς της ευδεμίδας. Θρίπας Καλιφόρνιας, Μύγα Μεσογείου, Μηλοπόνθη, Κοχυλίδα, Ταιγαροδόγους, Metcalfa pruinosa, Δροσόφιλβα. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. ***ΕΛΙΑ***: Δάκος. Δόση: **350 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Δολωματικός ψεκασμός από εδάφους με 500 κ.εκ. ανά ψεκαζόμενο δένδρο σύμφωνα με το πρόγραμμα δακοκτονίας και συνολικά 10 δένδρα/στρ. Από την έναρξη της πλήρης του πυρήνα του ελιαιοκάρπου και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. Πυρηνοτρήτης: α) Δόση: **15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εναντίον του ανθάκια γενιάς. Λίγο πριν τη πλήρη ανθόπαν και εφόσον υπάρχει μεγάλος πληθυσμός του εντόμου. β) Δόση: **30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εναντίον της καρπόβιας γενιάς, αμέσως μετά την καρπόδεση κατά την έναρξη της περιόδου ωοτοκίας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων εφόσον υπάρχουν. Πυγκτής, Καλόκορη, Ξυλοφάγα έντομα ελιάς, Σκολύτες (Φλοιοτρίβης & Φλοιοφάγος), Euzophera bigella, Κηκιδόμυγα, Κόσσος, Ωτόρρυγχος, Metcalfa pruinosa. Εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. ***ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ)***: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Θρίπας (Θ). Δόση: **50 κ. εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. Για τα Λεπιδόπτερα, ψεκασμοί κατά των εκκολαπτόμενων προνυμφών, σύμφωνα με τις συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες. ***ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ)***: Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Θρίπας, Αλευρώδης. Δόση: **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. Για τα Λεπιδόπτερα, ψεκασμοί κατά των εκκολαπτόμενων προνυμφών, σύμφωνα με τις συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες. ***ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)***: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Θρίπας (Θ), Αλευρώδης (Θ). Δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Μέγιστη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με τη εξέλιξή της. Για τα Λεπιδόπτερα, ψεκασμοί κατά των εκκολαπτόμενων προνυμφών, σύμφωνα με τις συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες. ***ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ)***: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αλευρώδης (Θ). Δόση: **50 κ. εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Μέγιστη δόση: 75 κ.εκ./στρ.Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. Για τα Λεπιδόπτερα, ψεκασμοί κατά των εκκολαπτόμενων προνυμφών, σύμφωνα με τις συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες. ***ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ***: Πιερίδα, Αφίδες, Αλευρώδης. Δόση: **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. ***ΜΑΡΟΥΛΙ (Θ)***: Θρίπας, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αλευρώδης. Δόση: **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. ***ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξερό)***: Αφίδες. Δόση: **50 κ.εκ./στρ**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. ***ΣΚΟΡΔΟ***: Θρίπας. Δόση: **50 κ.εκ./στρ**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. ***ΠΑΤΑΤΑ***: Δορυφόρος. Δόση: **50 κ.εκ./στρ**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. ***ΒΑΜΒΑΚΙ***: Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι. Δόση: **70 κ.εκ./στρ**. Ψεκασμοί καλύψεως κατά των εκκολαπτόμενων προνυμφών, σύμφωνα με τις συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη της προσβολής. ***ΜΗΔΙΚΗ***: Αφίδες, Φυτονόμος, Στόνα, *Colaspidema atrum, Apion trifolii*, Θρίπας, Πράσινο σκουλήκι. Δόση: **50 κ.εκ./στρ**. Ψεκασμός καλύψεως με την έναρξη της προσβολής. ***ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ***: Σποντόπτερα, Αφίδες, Άπτερες, Μαμέστρα, Θθοριμαία, *Pegomyia*, Ατομάρια, Κασσίδα, Κλεονός. Δόση: **50 κ.εκ./στρ**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. ***ΚΑΠΝΟΣ***: Θρίπας, Πράσινο σκουλήκι. Δόση: **50 κ.εκ./στρ**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της. ***ΓΑΡΥΦΑΛΟ-ΓΛΑΔΙΟΛΟΣ-ΖΕΡΜΠΕΡΑ-ΝΤΑΛΙΑ-ΓΥΦΟΦΙΛΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ***: Θρίπας. Δόση: **50 κ.εκ./στρ**. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της.

*Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):* Μηλιά-Κυδωνιά (80-150), Αχλαδιά-Μουσμουλιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά (80-140), Αμπέλι (100), Ελιά- Δολωματικό ψεκασμό (3, 500 κ.εκ./ψεκ. δένδρο & συνολικά 10 δένδρα/στρ.), Ελιά-Ψεκασμοί κάλυψης (80-150), Πιπεριά (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Καννός-Γαρύφαλο-Γλαδίολος-Ζέρμπερα-Ντάλια-Γυψοφίλη-Τριαντάφυλλο (50-100), Τομάτα (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ+Θ) (50-150), Μαρούλι (Θ) (40-100), Κρεμμιδάκι ξερό-Σκόρδο (30-50), Πατάτα (50-80), Βαμβάκι (50-70), Μπδική-Ζαχαροτευτλα (30-60).

*Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών:* Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσμουλιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Αμπέλι-Ελιά (Δολωματικό ψεκασμό)-Ελιά (Ψεκασμοί κάλυψης)-Πιπεριά (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Τομάτα (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ+Θ)-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Μαρούλι (Θ)-Κρεμμιδι ξερό-Σκόρδο-Πατάτα-Βαμβάκι-Ζαχαροτευτλα-Καννός-Γαρύφαλο-Γλαδίολος-Ζέρμπερα-Ντάλια-Γυψοφίλη-Τριαντάφυλλο (2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες, εφόσον απαιτείται), Μπδική (1).

*Παρατηρήσεις:*
*1) Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελοφυλλίων στα οποία έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος* ***Bulldock®***. *2)* Στις καλλιέργειες Ροδακινιές, Νεκταρινιές, Βερικοκιές, Δαμασκηνιές, οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκ. υγρού, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης/στρ. *3)* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεικόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Μαρούλι θερμοκηπίου, Κρεμμιδάκι ξερό, Σκόρδο, Καννός και Καλλιωνιστικά, από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που οφφορών στην αποτελεσματικότητα ή στη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** •Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων, ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. •Εφαρμογές μόνον όταν είναι απαραίτητες, με βάση τα πιθανά υψιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. •Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. •Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με **Bulldock®**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. •Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εκβρών/στόκων με τη χρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, έτσι ώστε να ανιχνεύθεί άγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. •Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκεύασμα διαφορετικής ομάδας. •Στις περιοχές, όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.