

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτία δεδομένων ασφαλείας. **«Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με ψεκαστήρες πλάτης»**  
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμπίσιμα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα ψεκασβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε άμεσα το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-77.93.777

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**  
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.  
**ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ -ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσεως της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.

**-ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Α) Αγκινάρες, ραδικί, μαρούλι, σκαρόλα: κανένα. Β) Ψυχανθή, καλαμπόκι, σόργο, καρότο, πατάτα, σέλινο, φρέουλα, βαμβάκι: 5 μήνες. Γ) Ζαχαρότευτλα, σπανάκι, κολοκυνθοειδή, λάχανο, ελαιοκράμβη, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα: 8 μήνες. Δ) Σπινάρι, αγρωστώδη για βοσκή, υρασίδια: 12 μήνες. Το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί KERB FLO 400 SC πρέπει να οργωθεί σε βάθος 15 εκ. πριν να σπαρεί με σπινάρι, αγρωστώδη ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν αναφέρει τα παραπάνω. Οι παραπάνω χρόνοι είναι οι μέγιστοι που απαιτούνται. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να μειωθεί σε θερμά κλίματα καθώς και όταν χρησιμοποιούνται οι χαμηλές δόσεις εφαρμογής.

**- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Να αποφεύγεται η επανεισόδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --**  
**ΤΕΛΕΥΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** 1) Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιδωνιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά), Αμπέλι, Ραβδί, Ηλιανθός, Ελαιοκράμβη, Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι: Μη εφαρμογίμο, 2) Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Αγκινάρα: 60 ημέρες, 3) Άγρια αγκινάρα: 120 ημέρες, 4) Φασολάκια νωπά, Φακή: 90 ημέρες, 5) Μαρούλι, Αντιό: 28 ημέρες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. **Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.**



**Propryzamide (προπιζαμίντ) Πυκνό εναιώρημα (SC)**  
**Εγγυημένη σύνθεση:** propryzamide 40% β/ο (ομάδα βενζαμιδία)  
Βοηθητικές ουσίες 61,85% β/β



**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ N**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** Dow AgroSciences B.V., Ιταλία.  
**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** Dow AgroSciences Export S.A.S., Γαλλία.  
**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΣ:** BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210-6860130, [www.basf-agro.gr](http://www.basf-agro.gr)  
**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Dow AgroSciences Italia Srl., Ιταλία  
**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος, Θεσσαλονίκη.  
™ Trademark of the Dow Chemical Company ('Dow') or any affiliated company of Dow.

**Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται αποτελεσματικά. Η ζιζανιοκτόνος δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση του πολυμερισμού της τουμπουλίνης με αποτέλεσμα την αναστολή της αύξησης του ριζικού συστήματος.**  
**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

• Υπόπτο καρκινογόνωσης.  
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 7956/ 13-4-2011  
**Περιεχόμενο: 600 κ. εκ.**

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά ή αμέσως μετά τη μεταφύτευση.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ**  
Εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της Κουσκοούτας, καθώς και ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων\*.

**1. ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιδωνιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά), ΑΜΠΕΛΙ:** Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**2. ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ:** Εφαρμόζεται α) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, β) αμέσως μετά τη μεταφύτευση. Δόση: 250 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**3. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΑΡΟΥΛΙ:** Εφαρμόζεται α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**4. ΡΑΔΙΚΙ:** Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά έως το 4<sup>ο</sup> φύλλο. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**5. ΑΝΤΙΑ:** Εφαρμόζεται α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**6. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ, ΦΑΚΗ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** Εφαρμόζεται α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**7. ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΑΓΡΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά στην έναρξη ανάπτυξης του βλαστού. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**8. ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** Εφαρμόζεται μετά το στάδιο των 2-4 φύλλων. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**9. ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ:** Εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης ή στο 50% της επιφάνειας του εδάφους. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 για όλες τις καλλιέργειες.

**\* ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ**  
**Πατύφυλλα:** Κουσκοούτα (*Cuscuta sp.*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Αγριοπιπεριά (*P. Persicaria*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Βερόνικα (*Veronica spp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*).  
**Αγρωστώδη:** Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Κοινή πτόα (*Poa annua*).  
**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**  
1. Στα φυλλώδη λαχανικά για την καλύτερη καταπολέμηση της κουσκοούτας, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως τα 500 κ.εκ./στρέμμα.  
2. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελοφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος KERB FLO 400 SC.  
**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**Αρ. Παρτίδας:** Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
**Ημ. Παραγωγής:** Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
**Ημ. Λήξης:** Ως άνω μέρος συσκευασίας.



041302α