

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. • Σε περίπτωση κατάπτωσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

«Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, απομακρύνετε τυχόν μολυσμένα ρούχα και πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάπτωσης, μην προκαλείτε εμετό. Δώστε στον πάσχοντα ιακό (1/2) λίτρο νερού να πίνει. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν δεν συνέρχεται ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Το TRIONA περιέχει κατά κύριο λόγο ορυκτέλαιο επεξεργασμένο με βοηθητικές ουσίες για να γίνει κατάλληλο γαλάκτωμα. Ακολουθείτε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 77.93.777

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

#### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν πρέπει να συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα (πολυθειούχα, Βορδигάλλειος πολτός), καθώς και με θείο, captan, folpet, morestan, dimethoate και tenn-cop.

#### ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Να μην εφαρμόζεται επί 30 μέρες, πριν ή μετά από εφαρμογές θείου και θειασβεστίου. Στα μηλοειδή και ιδίως στην αχλαδιά ποικιλίας Κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan σε διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας.

#### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΜΙΔΗ:

Αμπέλι, Ακτινιδιά: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΖΙΜΟ (λόγω του χρόνου εφαρμογής του)

Λοιπές καλλιέργειες: 21 ημέρες. Σε περίπτωση αναμειγρής με άλλο σκεύασμα να τηρείται η «τελευταία επέμβαση» του άλλου σκευάσματος (αν είναι πάνω από 21 ημέρες).

#### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε περίπτωση που το αναμειγμένο με βρέξιμη σκόνη, ετοιμασμένο πρώτο το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτέλαιου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: ---

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποθεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΟΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΜΑΤΟΣ:** Αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο στην αρχική, απαραιτήτως συσκευασία παραμένει σταθερό για 5 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμός Παρτίδας: Ως ανω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως ανω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Λήξης: Ως ανω μέρος συσκευασίας



BASF  
The Chemical Company

# Triona® 81 EW

Θερινός πολτός Γαλάκτωμα ορυκτέλαιου (EW)

Εγγυημένη σύνθεση: Ορυκτέλαιο 81% β/β (paraffin oil CAS No. 97862-82-3), Βοηθητικές ουσίες 18% β/β

Θερινός Πολτός κατά κοκκοειδών, αυγών ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Χι



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 1578 / 15.4.92

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Α. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.:210-6860130, [www.basf-agro.gr](http://www.basf-agro.gr)

®Σήμα κατατεθέν BASF

**ΠΡΟΤΙΠΩΣΕΙΣ:** Ψεκάστε κομμάτια φυλλώματος ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25 –30 atm) και μικρού τύπου σκούπας.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

**1) ΑΜΠΕΛΙ – ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ:** Χειμερινά αυγά του Κόκκινου τετράνυχου (*Panonychus ulmi*). Συνιστάται ένας ψεκασμός τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών, με δόση 1,2 λίτρα σκευάσματος στα 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

**2) ΜΗΛΟΕΙΔΗ – ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** **Κοκκοειδή:** Βαμβακάδα (*Pseudococcus citri*), Μαύρη Ψώρα (*Quadraspidiotus piri*), Παρλατόρια (*Parlatoria oleae*), Μυτιλόμορφη Ψώρα (*Lepidosaphes ulmi*), αυγά Ακάρεων, προνύμφες Αφίδων και άλλων εντόμων. **ΕΛΙΑ:** **Κοκκοειδή:** Παρλατόρια (*Parlatoria oleae*), Λεκάριο (*Saissetia oleae*), Ασπρη Ψώρα (*Aspidiotus nerii*), προνύμφες άλλων εντόμων. **ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ:** **Κοκκοειδή:** Κόκκινη Ψώρα (*Aonidiella aurantii*), Μυτιλόμορφη Ψώρα (*Lepidosaphes beckii*), Ασπρη Ψώρα (*Aspidiotus nerii*), Ψευδόκοκοκο (*Planococcus citri*), Ανθοτρήτης (*Prays citri*), Αφίδες (*Aphis* spp.), Καλοκόρις (*Calocoris trivialis*), Θρίπες (*Heliothis haemorrhoidalis*), Ακάρεα (*Tetranychus* spp., *Aceria sheldoni*, *Aculeus pelecassi*). Καλύτερη εποχή ψεκασμού για τα εσπεριδοειδή, αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και το Χειμώνα. **ΚΑΛΑΜΠΙΣΤΙΚΑ:** **Κοκκοειδή:** Παρλατόρια (*Parlatoria* spp.), Μυτιλόμορφη Ψώρα (*Lepidosaphes* spp.).

Συνιστάται σε ψεκασμούς: 1) Ανοιξές, με την έναρξη της βλάστησης, 2) Καλοκαιριού και 3) Φθινοπώρου, στις παρακάτω δόσεις: α) Σε ελαφρές έως μέτριες έντασης προσβολές: 0,5 –1,5 λίτρα σκευάσματος στα 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. β) Σε έντονες προσβολές, κυρίως Κοκκοειδών: 2 λίτρα σκευάσματος στα 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (αφορούν τις καλλιέργειες των παραγράφων 1 και 2):**

Α. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Το TRIONA εφαρμόζεται με ψεκασμούς: α. ανοιξές, β. καλοκαιριού, γ. φθινοπώρου. Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρις απορροής, οι οποίοι γίνονται με ψεκαστήρες: α) κοινού όγκου (5-6 atm), β) μηχανοκίνητου (25 –30 atm) και μικρού τύπου σκούπας.

Β. Κατά τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται στο στρέμμα: α) 100-200 λίτρα ψεκαστικού υγρού στα πυρροφόρα δέντρα, β) 50-80 λίτρα στα καλλωπιστικά, γ) 50 λίτρα στο αμπέλι και το ακτινιδίο.

Γ. Κατά την χρήση του θερινού πολτού τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα (για μην διψάνε - γι' αυτό ποτίζουμε μία βδομάδα πριν το ψεκασμό). Επίσης η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω των 32° C.

**3) ΠΕΥΚΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ** για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchalina hellenica* (βαμβακάδα).

Συνιστάται 1 εφαρμογή (για τον ίδιο σκοπό δεν θα χρησιμοποιηθεί και άλλο φυτοπροστατευτικό προϊόν την ίδια χρονική περίοδο) με δόση 2 λίτρα σκευάσματος στα 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, όταν έχει εκκολαφθεί το 70-75% των ερπυσμών νυμφών, όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώσει εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών. Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα πρέπει να προσδιορίζεται από τους Γεωπόνους των Δήμων και Κοινοτήτων ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας. Γίνεται ψεκασμός με καλή διαβροχή των προσβεβλημένων από το *Marchalina hellenica* τμημάτων των πεύκων, κατά την διάρκεια του οποίου είναι απαραίτητη η παρουσία Γεωπόνων.

- **Απαγορεύσεις:** Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα, καθώς και σε πεύκα που έχουν μελιτώσει εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση μελισσών.

- **Προϊονισμοί – προφυλάξεις:** α) Πριν από την εφαρμογή του TRIONA σε κοινόχρηστους χώρους, οι Δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό. β) Οι Δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επίσημηση των περιοχών όπου έγινε η εφαρμογή. γ) Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και έως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκασμένη περιοχή. δ) Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων.

Η χρήση του TRIONA, για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchalina hellenica* σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται:

Α) Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του.  
Β) Σε ιδιωτικούς χώρους (αυτές οπτιών, οικόπεδα κλπ), με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται και η εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.  
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, θα πρέπει να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του TRIONA στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής, και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.