

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μαζεύετε τη χυμένη ποσότητα.
- Δάσχετε τον περιέκτη σε σημεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασιών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Γενικά: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Διατηρήστε τον ζεστό και ξηλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποσμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά αφαιρέστε τους φακούς επαφής και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

- Για τις νωρίς εφαρμογές σε οπωρώνες να αφήνεται μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από υδάτινους όγκους είτε αναλλοτικτά να αφήνεται μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από υδάτινους όγκους σε συνδυασμό με ακρόβρια μείωσης της διασποράς (LDNI) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού.
- Για τις εφαρμογές αργά σε μεταγενέστερα στάδια σε οπωρώνες να αφήνεται μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από υδάτινους όγκους.

Επικινδύνωση για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδυνότητας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Συνδυάζει 2 δραστικά συστατικά με διαφορετικό τρόπο δράσης. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία. Το Chlorantraniliprole ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και δρα μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχών ρυανιδίων των εντόμων. Είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση κυρίως των πιο διαδεδομένων λεπιδοπτερον, κολεόπτερον και δίπτερον που προσβλήνουν τις διάφορες καλλιέργειες.

Η Abamectin έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Είναι αποτελεσματική ενάντια στα ακάρεα. Ανήκει στη χημική ομάδα των αβερμεκτινών.

Τρόπος εφαρμογής: Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδενύοντας την συνιστάμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδενύοντας συνεχώς. Ανακινάστε καλά πριν τη χρήση και κατά την εφαρμογή.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με καταλλήλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενεργόσιες.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη, τη φόρτωση και την εφαρμογή του σκευάσματος και χρησιμοποιείτε τραπέζι με κλειστή καμπίνα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

L1026186 GREC/11ης, NPPE4073601



Voliam Targo®

063 SC

syngenta®

Chlorantraniliprole + Abamectin

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 15458/16-11-2016

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Chlorantraniliprole 4,5% β/ο

Abamectin 1,8 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 93,51% β/β

Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολίν-3(2H)-όνη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση πολλών εχθρών σε μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, νεκταρινιά και θερμοκηπιακών κηπευτικών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E.,

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 666612-13 - www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδως, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME logo, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

ΠΡΟΣΟΧΗ



- **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**
- **Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.**
- **Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.**
- **Πολύ τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείεται: Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδωδίες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο – Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Επηρεάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Μέχρι 2 εφαρμογές σε μία καλλιεργητική περίοδο.
- Συγκεκριμένα, το σκεύασμα και τα άλλα προϊόντα της ίδιας ομάδας τρόπου δράσης, να εφαρμόζονται σε «παράθυρο εφαρμογών» όχι μεγαλύτερο από τη διάρκεια μιας γενιάς του εντόμου στόχου, και όχι περισσότερες από 2 φορές στο ίδιο διάστημα.
- Να ακολουθείται εφαρμογή προϊόντων διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Να αποφεύγεται η χρήση χαμηλότερων δόσεων από τις εγκεκριμένες, είτε όταν εφαρμόζεται μόνο του είτε και σε μείγμα προϊόντων.
- Να εφαρμόζεται, όσο είναι δυνατό, στα πιο ευαίσθητα στάδια του βιοεργικού κύκλου των εντόμων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκάζουσα φυλλική επιφάνεια.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μελιτζάνα (Θ), τομάτα (Θ): 7 ημέρες., Αγγούρι (Θ), πεπόνι (Θ), καρπούζι (Θ), πιπεριά (Θ), κολλοκύθα (Θ), κολλοκύθα (Θ), φράουλα (Θ): 3 ημέρες., Μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, νεκταρινιά: 14 ημέρες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Μηλιθόφια (Μηλιά, Αχλαδιά):

Δόση – τρόπος εφαρμογής: 75 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-120 κ.εκ.σκ./στέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στέμμα. Ψεκαμός φυλλώματος (IBCH 69-89). Από το τέλος της πτώσης των πετάλων. Για τα λεπιδοπτερα εφαρμόστε κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας και πριν την εκκόλληση των πρώτων αυγών. Για τα ακάρεα εφαρμόστε μετά την άνηση στην εμφάνιση της προσβολής. Για τη ψύλλη στην αχλαδιά, εφαρμόστε όταν τα αυγά πάρουν χρώμα κίτρινο / εμφάνιση πρώτων νυμφών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες.

Στόχοι: Καρποκόμια (Cydia pomonella, Grapholita molesta), Φυλλορύπκες (Leucoptera scitella, Phylloperlyta spp., Nepticula spp., Lyonetia spp.), Φυλλοδέστες (Argyrotaenia sp., Pandemis sp., Adoxophyes sp., Archips sp.), Πυραυλές (Ostrinia nubilalis), Τετράνυχτοι (Eriophyes pyri, Epitrimerus urticae, Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus sp.), Ψύλλη (Cacopsylla pyri).

Τυτρινόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά):

Δόση – τρόπος εφαρμογής: 75 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-120 κ.εκ.σκ./στέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στέμμα. Ψεκαμός φυλλώματος (IBCH 69-89). Από το τέλος της πτώσης των πετάλων. Για τα λεπιδοπτερα εφαρμόστε κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας και πριν την εκκόλληση των πρώτων αυγών. Για τους θρίπες/ τετράνυχτους εφαρμόστε στην εμφάνιση της προσβολής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες.

Στόχοι: Καρποκόμια (Cydia pomonella, Grapholita molesta), Ανάσια (Anarsia lineatella), Πυραυλές (Euzophera bigella, Ostrinia nubilalis), Τετράνυχτοι (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus sp.), Θρίπες (Frankliniella occidentalis, taeniothrips spp, thrips spp).

Μελιτζάνα(Θ), Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ), Πιπεριά (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολλοκύθα (Θ), Κολλοκύθα (Θ), Φράουλα (Θ):

Δόση – τρόπος εφαρμογής: 80 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ.σκ./στέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα/στέμμα. Ψεκαμός φυλλώματος (IBCH 12-59). Για τα λεπιδοπτερα εφαρμόστε κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας ή με την εμφάνιση των πρώτων νυμφών. Για τα ακάρεα εφαρμόστε με την εμφάνιση των πρώτων κιντών μορφών στα φύλλα. Για τη θυρίδα εφαρμόστε όταν είναι εμφανείς οι πρώτες στοές ή ανάλογα με τις αλληλεπιδράσεις στις παλιές.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.

Στόχοι: Πρόσβιο σκουλήκι, Φυλλοφάγες κόμπες (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis, Ostrinia nubilalis), Λυριόμυζα (Liriomyza spp.), Τετράνυχτοι (Tetranychus urticae), Φυλλορύπκες (Tuta absoluta).

Παρατηρήσεις: Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις ανά στέμμα για κάθε καλλιέργεια.

